



STAATLICHE LEHR- UND VERSUCHSANSTALT FÜR WEIN- UND OBSTBAU WEINSBERG

Referat Rebenzüchtung und Rebenveredlung D-74189 Weinsberg, Traubenplatz 5
TEL: +49 (0)7134 504185, FAX: +49 (0)7134 504189, e-MAIL: rebenzuechtung@lvwo.bwl.de

SAUVIGNON SARY



Züchtungsbezeichnung: **We 70-267-14**

Abstammung: **W. Riesling x Sauvignon blanc**

Kreuzungsarbeiten: **1970; Zucht-Nr. 70.666**

Pflanzung der Population: **946 Sämlinge;
Frühjahr 1972**

1. Traubenernte: **26. Oktober 1974**

1. Anbau in der Praxis: **1977**

Beim deutschen Bundessortenamt *Sortenschutz* &
„Zulassung“ erhalten: **22. März 2013
bzw. 22. Mai 2013**

Sortencharakterisierung und Weinbeschreibung

SAUVIGNON SARY verkörpert, trotz der beachtlichen Fruchtbarkeit, eine qualitätsorientierte Weißweinsorte mit guten weinbaulichen Eigenschaften.

SAUVIGNON SARY-Weine werden als fein, fruchtig und an Sauvignon blanc erinnernder Weintyp beschrieben.

LVWO-Züchtungsprogramme, Ertragsauswertung und Praxisanbau

Seit 2008: 2x als Kreuzungspartner in diversen genetischen Kombinationen LVWO-seits verwendet.

Auswertung aller Versuchspartzen (Durchschnittswerte der Erntejahre 1975 - 2013):
Ertrag: 136 kg/a - Mostgewicht: 83 ° Oechsle – Mostsäure: 10,1 g/l – Extrakt: 23 g/l.

Praxisanbau (Stand 2013): 17 Anbaueignungsversuche mit ~ 1,65 ha **SAUVIGNON SARY**-Fläche unter Vertrag.



SAUVIGNON SARY

Weinbauliche Merkmale und Anbauempfehlungen:

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| - Austriebszeitpunkt: | mittel | - Beerenreife: | mittel |
| - Wüchsigkeit: | mittel - stark | - Beerengröße: | mittel |
| - Triebhaltung | aufrecht - halbaufrecht | - Beerendichte: | locker - dichtbeerig |
| - Geiztrieb Bildung: | (wenig -) mittel | - Traubengröße: | mittel |
| - Blütezeitpunkt: | mittel - spät | - Traubenertrag: | (mittel -) hoch |
| - Blühfestigkeit: | mittel - gut | - Mostgewicht: | mittel (- hoch) |
| - Holzreife: | gut | - Mostsäuregehalt: | mittel - hoch |

SAUVIGNON SARY: Auffallend sind eine lichte Laubwand, welche die Pilzgefährdung reduziert, und robustes, lange assimilationsfähiges Blattwerk, das eine harmonische Zucker-Säure-Aroma-Leistung gewährleistet.

Als Standorte werden Kerner-Lagen empfohlen.

Die Unterlagsrebsorte kann nach der Bodenart gewählt werden.

Durchschnittliche Ernteresultate aus Versuchsanlagen:

Anbaugebiet	Sortenvergleich	ausgewertete Jahre	Ertrag		Mostgewicht		Mostsäure	
			kg/a	rel.	°Oe	rel.	g/l	rel.
SAUVIGNON SARY (Gesamtdurchschnitt)		1975-2013	136		83		10,1	
Durchschnitt der direkten	SAUVIGNON SARY	1986-2013	151	107	83	104	9,8	92
	W. Riesling		141	100	80	100	10,6	100
Sortenvergleiche in allen Anbaugebieten	SAUVIGNON SARY	2006-2013	106	110	87	102	8,8	95
	Sauvignon blanc		96	100	85	100	9,3	100
b.A. Pfalz	SAUVIGNON SARY	2007-2013	97	97	86	105	9,3	93
	Sauvignon blanc		100	100	82	100	10,0	100
b.A. Rheinhessen	SAUVIGNON SARY	2007-2013	149	119	86	100	9,8	99
	Riesling		126	100	86	100	9,9	100
b.A. Württemberg	SAUVIGNON SARY	2007-2012	125	130	88	98	8,7	97
	Sauvignon blanc		96	100	90	100	9,0	100
	SAUVIGNON SARY	2007-2013	91	84	88	106	9,0	88
	W. Riesling		108	100	83	100	10,3	100